



Che fare nel caso di contatto stretto con una persona positiva al COVID-19

Le indicazioni riportate schematicamente di seguito si applicano ai contatti stretti avvenuti in comunità. Si ricorda che i contatti nel contesto scolastico seguono indicazioni diverse specifiche per tale ambito.

VACCINATI o GUARITI

Vaccinati con dose booster o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni

UTILIZZO MASCHERINA FFP2 in tutti gli ambienti frequentati



AUTO-SORVEGLIANZA

Ultimo contatto stretto

Auto-monitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti


In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test

Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).

da più di 120 giorni e con Green Pass valido

VACCINATI (o GUARITI)

QUARANTENA BREVE



Ultimo contatto stretto

Fine quarantena con **test negativo** (molecolare o antigenico)

Anche in farmacia o dal medico curante

In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test

Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).

NON VACCINATI

Non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario completato da meno di 14 giorni

QUARANTENA COMPLETA



Ultimo contatto stretto

In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test

Anche in farmacia o dal medico curante

Fine quarantena con **test negativo** (molecolare o antigenico)

Dopo 4 mesi dalla guarigione, aderire appena possibile alla **campagna vaccinale**

Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).



Che fare se si risulta positivi al COVID-19

Il presente schema riporta le indicazioni standard. In presenza di sintomatologia è sempre opportuno fare riferimento al proprio medico curante per il monitoraggio delle condizioni di salute

VACCINATI o (GUARITI)

Vaccinati con dose booster o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni

ISOLAMENTO

Positivo senza sintomi



↑ **Test positivo**
(molecolare o antigenico)

↑ Fine isolamento con **test negativo**
(molecolare o antigenico).

ISOLAMENTO

Positivo con sintomi



↑ **Test positivo***
(molecolare o antigenico)

↑ Fine isolamento con **test negativo****
(molecolare o antigenico).

* Nel soggetto con sintomi presenti prima del test, il conteggio dell'isolamento parte dal giorno di inizio sintomi.

** Il test di guarigione (molecolare o antigenico di 2^a, 3^a o 4^a generazione) deve essere effettuato, in ogni caso, dopo almeno 3 giorni di assenza di sintomi. Se il test è positivo, ripetere il test dopo altri 7 giorni; se è ancora positivo, l'isolamento termina dopo il 21° giorno.

Non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni o vaccinati con ciclo primario completo da più di 120 giorni

NON VACCINATI

ISOLAMENTO



↑ **Test positivo***
(molecolare o antigenico)

Fine isolamento con **test negativo****
(molecolare o antigenico).

Dopo 4 mesi dalla guarigione, aderire appena possibile alla **campagna vaccinale**

* Nel soggetto con sintomi presenti prima del test, il conteggio dell'isolamento parte dal giorno di inizio sintomi.

** Il test di guarigione (molecolare o antigenico di 2^a, 3^a o 4^a generazione) deve essere effettuato, in ogni caso, dopo almeno 3 giorni di assenza di sintomi. Se il test è positivo, ripetere il test dopo altri 7 giorni; se è ancora positivo, l'isolamento termina dopo il 21° giorno.